


Handleiding: Hoe voert u het recept voor Symbicort in MicroHIS 8.5 in met de dosering SMART?

Eenmalige instelling:

1. Selecteer een patiënt en kies **Akties – Voorschrijven**
2. Klik in het aanvinkvakje **'HPK'** om een vinkje te plaatsen
3. Klik in het veld **'Medicament'** en vul in: SYMBP2
4. Klik op 

Het geneesmiddel 'SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO' verschijnt, zonder dosering, dosis of gebruik
5. Kies **Beheer - Onderhoud medicatiegebruik**

Het scherm 'MMG-M-01 Onderhoud med. gebruik' verschijnt



Figuur 1

Tot 18 jaar in principe alleen onderhoud

6. **'Leeftijd'**: klik in het tweede veld en vul 18 in
7. **'Dosering 1'**: 2D1I
8. Druk op **<Tab>**
9. Vul bij voorschrift in: **'No'** 120
10. Kies bij Einddatum het keuzerondje **'Aantal (dgn)'**
11. Vul in veld **'Voldoende voor:'** in 60
12. Klik op **[Invoeren]**

De melding 'Medicatiegebruik gegevens ingevoerd' verschijnt
13. Klik op **[OK]**

Vanaf 18 jaar ook inzetbaar als "zonodig"

14. Klik op **[Annuleer]**
15. **'Leeftijd'**: vul in het eerste veld 18 in
16. **'Leeftijd'**: klik in het tweede veld en vul 99 in
17. **'Dosering 1'**: 2D1I
18. Klik en vul in de eerste vier velden van het gebruiksvoorschrift de volgende codes in (druk na iedere ingevulde code op **<Tab>**):


BB ZN MMD MX8PD
19. Vul bij voorschrift in: **'No'** 120
20. Kies bij Einddatum het keuzerondje **'Aantal (dgn)'**
21. Vul in veld **'Voldoende voor:'** 60 in
22. Klik op **[Invoeren]** (zie Figuur 1)

De melding 'Medicatiegebruik gegevens ingevoerd' verschijnt
23. Klik op **[OK]**

24. Kies '**Terug!**'
Het scherm 'MDI-M-01 Samenstellen recept' verschijnt weer
25. Klik op [**Vervallen**]
Het oorspronkelijke voorschrift wordt gewist

Voorschrijven Symbicort Turbuhaler 200/6 met de dosering SMART

1. Selecteer een patiënt en kies **Akties - Voorschrijven**
2. Klik in het aanvinkvakje '**HPK**' om een vinkje te plaatsen
3. Klik in het veld '**Medicament**' en vul in: SYMBP2
4. Druk op <Enter>
Het scherm 'MDI-M-01 Samenstellen recept' met het voorschrift 'SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO' verschijnt, met dosering, dosis en gebruik (zie Figuur 2)



Figuur 2

5. Klik op [**Wijzigen**] om een tweede medicament voor te schrijven of [**Verwerk**] om het recept af te drukken of te verzenden

Symbicort voorschrijven zonder memocode en op naam specialité (HPK)

1. Selecteer een patiënt en kies **Akties - Voorschrijven**
2. Klik in het aanvinkvakje '**Memo**' om het vinkje weg te halen
3. Klik in het aanvinkvakje '**HPK**' om een vinkje te plaatsen
4. Klik in het veld '**Medicament**' en vul in: symbicort
5. Druk op <Enter>
Het scherm 'MDI-M-01 Samenstellen recept' met het voorschrift 'SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO' verschijnt, met dosering, dosis en gebruik
6. '**Dosering**': verander de dosering van 2D11 in 2D2I
7. '**Status**': klik in het veld 'S' en druk op <F1>
Het scherm 'Recept, status medicament' verschijnt
8. Dubbelklik op de optie 'C' (Continu)
Het scherm 'MDI-M-01 Samenstellen recept' verschijnt
9. Klik op [**Wijzigen**] om een tweede medicament voor te schrijven of [**Verwerk**] om het recept af te drukken of te verzenden
Melding: 'Einddatum aanpassen?' verschijnt
10. Klik op [**Ja**]